

В жизни женщины могут возникнуть такие ситуации , в которых эффективность гормональных контрацептивов будет снижаться , а действие других препаратов – видоизменяться .
Почему это происходит ?

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Клиника предлагает спектр услуг](#)

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

Ситуация 1. Прием антибиотиков, таких как ампицилин, метронидазол, хинолоны, тетрациклин , уменьшает количество бактериальной флоры

в
желудочно-кишечном
тракте
и
потому
влияет
на
усвоение
компонентов
противозачаточных
таблеток
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Экстренная контрацепция или праздник без последствий](#)

Ситуация 2. При расстройстве кишечника, желудка также может нарушиться всасывание
противозачаточного
препарата
, а
следовательно
,
снизится
и
контрацептивный
эффект
.
Поэтому
в
случае
сильного
отравления
следует
обратиться
за
консультацией
к
врачу-гинекологу
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Легенды о контрацепции](#)

Ситуация 3. Существует мнение, что прием веществ, которые стимулируют метаболизм

особность

печени

,

может

изменять

эффективность

оральной

контрацепции

. К

таким

веществам

относится

зверобой

.

Среди

прочих

препаратов

карбамазепин

(

тегретол

),

фенобарбитал

,

пирамидон

,

рифампицин

(

рифампин

),

возможно

и

гризеофульвин

.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Методы контрацепции вчера и сегодня](#)

Ситуация 4. Некоторые противоэпилептические препараты также могут снизить эффективность оральной контрацепции

.
Поэтому
больным
эпилепсией
женщинам
,
рекомендуется
рассмотреть
альтернативные
методы
контрацепции
,
такие
как
внутриматочная
спираль
или
барьерный
,
подбор
которых
сделает
врач-гинеколог
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Как побудить мужчину участвовать в выборе контрацептива?](#)

Ситуация 5. Прием оральных контрацептивов, ускоряет воздействие на организм таких препаратов как диазепам (валиум), хлордиазепоксид (либриум

),
трициклических
антидепрессантов
и
теофиллина
, что
означает
необходимость
снижения
их
дозировки
. И,
наоборот
,
чтобы
подействовал
ацетаминофен
или
аспирин
,
женщинам
,
принимающим
оральные
контрацептивы
,
необходима
более
высокая
доза
, чем
не
принимающим
их
женщинам
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Противозачаточные свечи: мифы и реальность](#)

Ситуация 6. Необходимо приостановить прием оральных контрацептивов за 4 недели до хирургической операции, проводимой под общим наркозом. Причина этого – риск послеоперационного тромбоза.

Напоминаем, что решение о начале, временной приостановке или прекращении приема оральных контрацептивов, должно приниматься при непосредственном участии гинеколога. Прием дополнительных лекарственных средств также должен быть согласован с врачом

⋮