

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

Гонорея – это инфекционное заболевание, которое передается половым путем. Возбудителем гонореи является гонококк.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Молочница](#) - « дама » капризная

Первые симптомы заболевания у мужчин появляются на 2-5 сутки после заражения, у женщин – на 5-10 сутки.

Гонорея начинается с небольшого жжения и зуда в области мочеиспускательного канала.

Сначала появляются слизистые выделения,

но уже через 2-3 дня

выделения
становятся
слизисто-гнойными

, а
затем

—
гнойными

.
Мочеиспускание
сопровождается
резкой
болью

;
наблюдаются
частые
позывы
к
мочеиспусканию

.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Опасные связи : что нужно знать о « взрослых » болезнях](#)

Следует отметить, что в некоторых случаях гонорея протекает бессимптомно, особенно у женщин

.

В чем опасность гонореи

При отсутствии лечения гонорея может стать причиной бесплодия (как у мужчин, так и у женщин

),
внематочной
беременности

,
выкидыша

,

рождения
мертвого
и
недоношенного
ребенка
и
привести
к
повышению
риска
развития
ВИЧ-инфекции
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Хламидиоз](#) : [коварство](#) [и](#) [любовь](#)

При распространении гонококков на другие органы могут поражаться суставы, кожа,

головной
мозг
,
сердце
и
печень
, а
также
возникнуть
гонококковый
конъюнктивит
.

[История вопроса](#)

Поскольку гонококк является бактерией, то для лечения гонореи на протяжении многих лет используются антибиотики

.
Но
пока
врачи
сражаются
с
бактериями
с
помощью
антибиотиков
,
бактерии
сражаются
с
врачами
и
создают
механизмы
защиты
,
которые
позволяют
им
ускользнуть
от
действия
препаратов
,
выработав
устойчивость
к
антибиотикам
.

Так, в 1940-х годах гонококк приобрел устойчивость к сульфаниламидам, в 1980-х – к пенициллину

,
тетрациклину
,
хлорамфениколу
,
эритромицину
и
стрептомицину

, а в 2007 г. — к
фторхинолонам
, в т.ч. к
ципрофлоксацину
.

Современная ситуация

В настоящее время для лечения гонореи используются только цефалоспорины треть
его по
коления
:
цефиксим
и
цефтриаксон
.
Однако
гонококк
постепенно
приобретает
устойчивость
и к
этим
антибиотикам
. С 2006
по
2011 год
устойчивость
к
цефиксиму
увеличилась
в 17 раз, а к
цефтриаксону
— в 10 раз.

Случаи гонореи, устойчивой к цефалоспорином, зарегистрированы в США, Японии, Н
орвегии
и
Великобритании
.

Что делать

Не стоит отчаиваться, ВОЗ разработала план действий, который не допустит распространения гонореи

,
устойчивой
к
антибиотикам

.
Основными
положениями
этого
плана
являются
:

- Профилактика, ранняя диагностика и правильное лечение гонореи.
- Выявление случаев гонореи, устойчивой к антибиотикам.
- Создание лабораторий для определения устойчивости гонококка к антибиотикам.
- Создание новых препаратов для лечения гонореи .

[Запись на консультацию по телефону : 8 \(8634\) 36 46 01 в Таганроге](#)

Клиника работает ежедневно.

Часы приема врачей – с 10.00 до 15.00.

Суббота - с 10.00 до 13.00

Е-mail: klinika@vvi-klinika.ru

Лицензия № ЛО-61-01-001709