



И дневное, и ночное недержание мочи могут иметь генетическую основу, в соответствии с результатами ультратонарного исследования нового, крупного исследования. Хотя было известно, что ночной энурез может быть наследственным, ранее только в немногих исследованиях отмечали связь между генетическими нарушениями и дневным контролем функции мочевого пузыря.

.

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

Данные исследования, опубликованного в онлайн версии The Journal of Urology, свидетельствуют о том, что вероятность развития тяжелого дневного недержания у детей в 3-10 раз выше, если кто-то из родителей в анамнезе имеет данную патологию.

.

Д-р Александр фон Гонтард из Больницы при Университете Сирлэнда, Германия, и его коллеги изучали данные более 8000

детей
в
Великобритании
в
рамках
исследования
Avon Longitudinal Study of Parents and Children.
Родители
заполняли
вопросники
о
своих
эпизодах
недержания
мочи
в
дневное
и
ночное
время
в
возрасте
до
5 лет, а
данные
по
детям
собирали
в
возрасте
до
7,5 лет. В
целом
, 15,5% и 7,8%
детей
страдают
ночным
и
дневным
недержанием
мочи
,
соответственно
.
Тяжелая
степень

ночного
недержания
мочи
,
определяемого
как 2 и
более
эпизода
в
неделю
,
встречается
у 2,6%
детей
. У 1%
детей
определили
дневное
недержание
мочи
тяжелой
степени
.

Исследователи отметили достоверные показатели при сравнении показателей недержания мочи у детей и их родителей . При наличии у мамы или отца в детском возрасте ночного недержания мочи

Автор: <http://www.uroweb.ru>

07.09.2011 13:53 - Обновлено 16.05.2018 13:56

с
частотой
2
раза
в
неделю
и
более
риск
развития
недержания
мочи
тяжелой
степени
у
их
ребенка
возрастает
в 3,63 и 1,85 раз,
соответственно
(для
обоих
показателей
Р