

Брюшной тиф способен уничтожить кишечник и спровоцировать осложнения. Как распознать, как лечить и как предупредить брюшной тиф.

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

Болезнь передается через грязные руки и продукты питания (сырые яйца, мясо). Возбудитель брюшного тифа *Salmonella typhosa* (*Salmonella enterica*). При заражении у человека начинается острая кишечная инфекция с лихорадкой, интоксикацией, сыпью на коже

.
Печень
и
селезенка
увеличиваются
в
размерах
.
Поражается
лимфатическая
система
нижнего
отдела
тонкой
кишки
.
Брюшной
тиф сам
по
себе
—
смертельная
болезнь
.
Но
он
также
опасен
осложнениями
.

Течение болезни

В кишечнике бактерия *Salmonella typhosa* активно размножается. Возникают сильные боли в животе, начинается понос, поднимается температура. Клетки и ворсинки, выстилающие кишечник, погибают. В кишечнике появляются многочисленные глубокие незаживающие и кровоточащие язвы. Главная опасность – разрыв стенки кишечника и попадание содержимого кишечника в брюшную полость. Кроме того, бактерии могут проникнуть через стенки кишечника в лимфатическую и кровеносную систему, и распространиться

по
всему организму.

Симптомы

- Слабость
 - Температура
 - Интоксикация
 - Низкое
-
- давление
 - Бледная
 -
 - кожа
 - Заторможенные
 - реакции
 - На
 - 4-5 день на животе, выше пупка и на груди появляются высыпания, которые могут держаться от 2-3 часов до нескольких суток.

Лечение

1.

Антибиотики.

2.

От малейшей нагрузки у больного может разорваться стенка кишечника. Поэтому предписывается строгий постельный режим.

3.

Надежную защиту от брюшного тифа дает вакцина. В обязательном порядке прививку должны сделать те, кто отправляется в районы, где случаются вспышки брюшного тифа. [Брюшной тиф – болезнь, убивающая кишечник](#)