Автор: Administrator
10.07.2008 15:04 -



Бактериальный вагиноз - это нарушение экосистемы влагалища, вызванная усиленным ростом преимущественно бактерий. Резкое снижение кислотности влагалища и концентрации лактобацилл осуществляется не одним патогенным микроорганизмом, а совокупностью нескольких, вследствие чего бактериальный вагиноз является полимикробным заболеванием.

Возбудителями бактериального вагиноза считаются бактерии - гарднерелла, микоплазма, бактероиды и другие. К предрасполагающим факторам, ведущим к развитию бактериального вагиноза, относят: заболевания шейки матки, перенесенное ранее воспалительное заболевание половых органов, нарушение менструального цикла, длительное использование внутриматочных контрацептивов, длительное и бесконтрольное применение антибиотиков и др. У 2/3 женщин, страдающих вагинозом, выявляется дисбактериоз кишечника. Кроме того, вагиноз тесно связан с развитием большинства гинекологических заболеваний. К таковым относятся воспалительные заболевания придатков и матки, хориоамнионит, преждевременные роды, низкая масса тела новорожденных и др.

Основными проявлениями вагиноза являются однородные выделения из влагалища, пенистые, слегка тягучие, белого или серого цвета с неприятным запахом. Длительность существования этих проявлений может исчисляться годами. При длительно текущем процессе выделения приобретают желтовато-зеленоватую окраску, становятся более густыми, нередко напоминают творожистую массу. Количество белей варьирует от умеренных до весьма обильных.

ЛЕЧЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА

Цель лечения вагиноза - восстановить нормальную микрофлору влагалища. До настоящего времени терапия вагиноза во время беременности остается сложной проблемой. Это связано с возможным неблагоприятным влиянием используемых препаратов на плод. Тем не менее лечение вагиноза во время беременности

необходимо, так как изменения флоры влагалищного содержимого могут привести к преждевременному прерыванию беременности, хориоамниониту, способствовать развитию послеродового эндометрита и раневой инфекции. Поэтому во II и III триместрах беременности необходимо проводить терапию вагиноза путем местного применения лекарственных препаратов.

Оригинал статьи на http://www.pochtymama.ruweb.net