
Автор: Administrator
20.06.2008 10:02 -



Правда ли, что мастопатия может перейти в рак груди? Альбина. Москва.

- Главная причина мастопатии - гормональный сбой. Мастопатия бывает двух видов. Диффузная редко приводит к необратимым последствиям. А вот более тяжелая ее форма - очаговая - увеличивает риск рака груди в несколько раз. Но чем внимательнее вы наблюдаете за своим организмом, тем выше шансы захватить болезнь на самой ранней стадии и полностью вылечить.

Типичные симптомы диффузной мастопатии: болезненные ощущения в молочных железах перед менструацией. Это похоже на обычный ПМС. Но постепенно боль усиливается, может отдаваться в лопатку, плечо, подмышечную область. На ощупь ощущается небольшое уплотнение без четких границ. Но, конечно, самообследования недостаточно - нужно пойти на прием к маммологу, сделать рентгеномаммографию.

Злая миома многим знакома

Как на ранних стадиях можно распознать миому матки? Это очень опасная болезнь? Светлана С. Ярославль.

- Миома матки - это доброкачественная опухоль. Одна из причин возникновения миомы - высокий уровень эстрогенов, женских половых гормонов, вырабатывающихся яичниками. Миома матки встречается у 20% женщин после 30 лет. Но важно не наличие миомы, а характер заболевания. С миомой можно прожить всю жизнь, даже не зная о ее наличии, но она может доставить и множество неприятностей: кровотечения, боли и даже бесплодие... Все зависит от места ее расположения и тенденции к росту. Если она

начинает быстро расти, приходится удалять.

Симптомы миомы: обильные менструальные кровотечения; боль; симптомы сдавления органов малого таза (затруднение мочеиспускания, боли в пояснице). Но симптомы многих заболеваний «по-женски» схожи. Чтобы точно поставить диагноз, нужны осмотр гинеколога, УЗИ, может быть, лапароскопия, гистероскопия.

Где защита от кольпита?

Мне 49 лет, у меня обнаружили кольпит. Как лучше лечиться? Марина Сергеевна. Москва.

- Для того чтобы лечить кольпит, нужно в обязательном порядке выявить, что за возбудитель. Кольпит может быть кандидозный (грибковый), а может быть бактериальный. Кроме того, в период климакса кольпит может возникать на фоне снижения эстрогенной активности. В зависимости от результатов анализов (мазок и посев) назначают терапию - либо противогрибковую, либо антибактериальную. Есть мази, кремы и гели, которые помогают регенерации ткани в климактерическом возрасте.