



Шотландские ученые утверждают, что после выкидыша нет необходимости откладывать беременность

*на
срок
до
шести
месяцев
, как
того
требуют
рекомендации
ВОЗ.*

Выкидыш – самопроизвольное прерывание беременности на ранних сроках, когда плод

д
еще
не
способен
к
жизни
вне
утробы
матери
–
не
такое
уж
редкое
явление

.
Теоретически

,
беременность
после
выкидыша
возможна
в

ближайшие
несколько
месяцев

.

Но
на
практике
врачи
рекомендуют
отложить
это
событие
хотя
бы
на
полгода

.

Доктор
Сохини
Бхаттачариа
(
Sohinee
Bhattacharya
)
из
Абердинского
университета
(University of Aberdeen)
считает
, что
пора
пересмотреть
эти
рекомендации
ВОЗ.

Ее уверенность базируется на результатах ретроспективного анализа статистики сам
опроезвольных
абортов
шотландских
больниц

.

Всего
исследователи

изучили
истории
беременности
30 000
женщин
.
Результаты
этой
работы
показали
, что у
женщин
,
зачавших
ребенка
в
течение
шести
месяцев
после
выкидыша
,
меньше
вероятность
повторения
самопроизвольного
аборта
,
внематочной
беременности
,
преждевременных
родов
или
необходимости
в
кесаревом
сечении
по
сравнению
с
женщинами
, у
которых
новая
беременность

наступила
между
шестью
и
двенадцатью
месяцами
после
неудачной
. При
этом
вероятность
того
, что
малыш
при
рождении
будет
иметь
малый
вес,
также
снижалась
.

В статье, опубликованной в «Британском медицинском журнале» ([British Medical Journal](#)), исследователи отмечают, что нет необходимости препятствовать зачатию после выкидыша, если не имеется серьезных причин для задержки, например

,
признаков
инфекции
.

Ученые акцентируют внимание на том, что в современном мире, когда женщины в молодости строят карьеру, а беременность откладывают на более поздние годы, любая отсрочка уменьшает их шансы родить здорового ребенка.