Автор: http://www.zdorovieinfo.ru
26.06.2010 16:18 - Обновлено 25.07.2011 12:52

**По мнению американских медиков, пора бить тревогу: средства, понижающие ар
териальное
давление
,
стали
слишком
часто
провоцировать
раковые
заболевания
.**

Речь идет о лекарствах класса блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА). Медикам
енты дан
ной
группы
препятствуют
действию
ангиотензина
–
вещества
,
повышающего
артериальное
давление
.

Исследователи из Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде (США) провели ан
ализ
препаратов
БРА
на
примере
телмисартана
(
торговое
название
микардис
),
производитель
немецкая
фирма

Boehringer Ingelheim, козаара (марка лозартан) производства Merck & Co, диована или валсартана (швейцарская фирма Novartis), ирбесартана (совместное производство Sanofi-Aventis и Bristol-Myers Squibb под названием авапро), беникара или олмесартана (Daiichi Sankyo) и теветена или эпросартана (Solvay Pharmaceuticals).

Результаты проверки показали, что большинство пациентов (86%) принимает микарди с . Имен но эт от

препарат
и
оказался
связан
с
увеличением
заболеваемости
раком
более
чем
на
1%.
Наиболее
частым
видом
онкозаболеваний
был
признан
рак
легких
(0,9%).
Специалисты
поясняют
, что
риск
является
хоть
и
умеренным
,
но
статистически
значимым
.

По словам соавтора работы доктора Илке Сипахи, пока нет точных данных о том, ко в
сему
ли
классу
данных
лексредств
относится
этот
побочный

эффект
, или
же
к
отдельному
медикаменту
. В
то
же
время
представители
компании
Boehringer
Ingelheim
заявили
, что
результаты
трех
масштабных
исследований
,
проведенных
ими,
не
подтверждают
сведения
о
повышении
заболеваемости
раком
.

Кардиолог из Клиники Кливленда доктор Стивен Ниссен в своем комментарии назвал
результаты
исследования
тревожными
и
провокационными
.
Он
призывает
более
детально
изучить

действие
данного
класса
препаратов
, а
врачам
проявлять
осторожность
в
их
назначении
.
По
его
мнению
,
зачастую
подобные
лекарства
выписывают
из-за
агрессивной
маркетинговой
политики
фармацевтических
компаний
, в
то
время
как
более
дешевые
препараты
из
группы
ингибиторов
ангиотензин-превращающего
фермента
(АПФ)
не
менее
эффективны
.

Тем не менее, эксперты не призывают отказываться от применения средств, снижающих артериальное давление, так как отсутствие лечения гипертонии может привести к серьезным осложнениям, нередко со смертельным исходом.

Все исследователи сходятся во мнении, что этот вопрос требует дальнейших исследований, и пациенты, страдающие высоким артериальным давлением, ни в коем случае не должны отказываться от приема лекарств, его понижающих, сообщает журнал

«
Ланцет
Онкология
» (
Lancet Oncology
).
Оригинал
статьи
zdorovieinfo.ru
/news/meditsina/...