Автор: http://www.zdorovieinfo.ru
24.01.2012 12:48 - Обновлено 16.05.2018 14:05

Все трясется, сердце бьется, глаза выскочить хотят. В этом коротком стихотворении п очти все симптомы болезни щитовидной железы , когда гормонов так много , что невозможно на месте усидеть . Как распознать и как лечить эту хитрую болезнь ?

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - **Клиника предлагает спектр услуг**

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

Щитовидная железа продуцирует гормоны, и если она хорошо работает, то самочувст вие у чел овека хорошее

.
Если
же
этот
орган
воспаляется
(
происходит
это, как
правило
,
после
вирусной
инфекции
),
человек
начинает
жаловаться
на
боль
в
области
шеи. Эти
симптомы
можно
ошибочно
принять
за
симптомы
ангины
.
Симптомы
заболевания
появляются
чуть
позже
:
щитовидная
железа
увеличивается
в
размерах
и
начинает
производить
избыточное

количество
гормонов
.

Течение болезни

- Первая стадия заболевания начинается с местного воспаления. Больному каже
тся
,
что у
него
болит
горло
,
хотя
на
самом
деле
болит
в
области
передней
поверхности
шеи, а сам зев
спокоен
. При
этом
боль
может
отдаваться
в ухо и
челюсть
и
периодически
усиливаться
.

- Поднимается температура до 39-40 градусов. Через 7-10 дней фолликул щитов
идной
железы
разрывается
и
содержимое
поступает

в
ткани
.

- При повышенном уровне гормонов щитовидной железы человек чувствует гипер
активность
,
появляется
дрожь
в
руках
,
учащается
сердцебиение
,
увеличивается
потоотделение
.

- После первой стадии болезни наступает вторая, когда человеку, наоборот, гор
монов
не
хватает
. И
вместо
бешенной
активности
наступает
период
упадка
сил.

- На последней стадии болезни щитовидная железа возвращается в свое нормал
ьное
со
стояние
и
начинает
производить
нормальное
количество
гормонов
.

Лечение

- Обычно тиреоидит проходит через 3-4 месяца, поэтому лечение симптоматическое: противоспалительные препараты, которые уменьшат боль и снимут отек щитовидной железы, а так же лекарства, которые замедляют пульс (бета-блокаторы).

- В тяжелых случаях назначают глюкокортикоиды – преднизолон по 30 мг в сутки.

Осложнения

Возможно развитие хронической формы. Лица, перенесшие подострый тиреоидит, подлежат наблюдению у эндокринолога в течение 2 лет с

динамическим
исследованием
функции
щитовидной
железы
и
контролем
ультразвукового
сканирования
.

Воспаление щитовидки: отчего бывают перепады настроения.