Автор: http://www.zdorovieinfo.ru
27.04.2012 16:03 - Обновлено 16.05.2018 11:52

В жизни женщины могут возникнуть такие ситуации, в которых эффективность гормональных противозачаточных препаратов будет снижаться, а действие других препаратов – видоизменяться. Почему это происходит?

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - **Клиника предлагает спектр услуг**

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

Ситуация 1. Прием антибиотиков, таких как ампицилин, метронидазол, хинолоны, тетрациклин, уменьшает количество бактериальной флоры

в
желудочно-кишечном
тракте
и
потому
влияет
на
усвоение
компонентов
противозачаточных
таблеток
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Экстренная контрацепция или праздник без последствий

Ситуация 2. При расстройстве кишечника, желудка также может нарушиться всасывание п
ротивозачаточного
препарата
, а
следовательно
,
снизится
и
контрацептивный
эффект
.
Поэтому
в
случае
сильного
отравления
следует
обратиться
за
консультацией
к
врачу-гинекологу
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Легенды о контрацепции

Ситуация 3. Существует мнение, что прием веществ, которые стимулируют метаболическую способность печени, может изменять эффективность оральной контрацепции. К таким веществам относится зверобой. Среди прочих препаратов карбамазепин (тегретол), фенобарбитал, пирамидон, рифампицин (рифампин), возможно и гризеофульвин.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Методы контрацепции вчера и сегодня

Ситуация 4. Некоторые противоэпилептические препараты также могут снизить эффективность оральной контрацепции. Поэтому больным эпилепсией женщинам, рекомендуется рассмотреть альтернативные методы контрацепции, такие как внутриматочная спираль или барьерный, подбор которых сделает врач-гинеколог.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Как побудить мужчину участвовать в выборе контрацептива?

Ситуация 5. Прием оральных контрацептивов, ускоряет воздействие на организм так их препаратов как диазепам (валиум), хлордиазепоксид (либриум

),
трициклических
антидепрессантов
и
теофиллина
, что
означает
необходимость
снижения
их
дозировки
. И,
наоборот
,
чтобы
подействовал
ацетаминофен
или
аспирин
,
женщинам
,
принимающим
оральные
контрацептивы
,
необходима
более
высокая
доза
, чем
не
принимающим
их
женщинам
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Противозачаточные свечи: мифы и реальность

Ситуация 6. Необходимо приостановить прием оральных контрацептивов за 4 недели до хирургической операции, проводимой под общим наркозом. Причина этого – риск послеоперационного тромбоза.

Напоминаем, что решение о начале, временной приостановке или прекращении приема оральных контрацептивов, должно приниматься при непосредственном участии гинеколога. Прием дополнительных лекарственных средств также должен быть согласован с врачом .