

В жизни женщины могут возникнуть такие ситуации , в которых эффективность гормональных противозачаточных препаратов будет снижаться , а действие других препаратов – видоизменяться .
Почему это происходит ?

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Клиника предлагает спектр услуг](#)

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

Ситуация 1. Прием антибиотиков, таких как ампицилин, метронидазол, хинолоны, тетрациклин , уменьшает количество бактериальной флоры

В
желудочно-кишечном
тракте
и
потому
влияет
на
усвоение
компонентов
противозачаточных
таблеток
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Экстренная контрацепция или праздник без последствий](#)

Ситуация 2. При расстройстве кишечника, желудка также может нарушиться всасывание ротивозачаточного препарата, а следовательно, снизится и контрацептивный эффект.
Поэтому в случае сильного отравления следует обратиться за консультацией к врачу-гинекологу.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Легенды о контрацепции](#)

Ситуация 3. Существует мнение, что прием веществ, которые стимулируют метаболическую особенность печени

, может изменять эффективность оральной контрацепции. К таким веществам относится зверобой

. Среди прочих препаратов карбамазепин (тегретол), фенobarбитал, пирамидон, рифампицин (рифампин), возможно и гризеофульвин.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Методы контрацепции вчера и сегодня](#)

Ситуация 4. Некоторые противоэпилептические препараты также могут снизить эффективность оральной контрацепции

.
Поэтому
больным
эпилепсией
женщинам
,
рекомендуется
рассмотреть
альтернативные
методы
контрацепции
,
такие
как
внутриматочная
спираль
или
барьерный
,
подбор
которых
сделает
врач-гинеколог
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Как побудить мужчину участвовать в выборе контрацептива?](#)

Ситуация 5. Прием оральных контрацептивов, ускоряет воздействие на организм таких препаратов как диазепам (валиум), хлордиазепоксид (либриум)

),
трициклических
антидепрессантов
и
теофиллина
, что
означает
необходимость
снижения
их
дозировки
. И,
наоборот
,
чтобы
подействовал
ацетаминофен
или
аспирин
,
женщинам
,
принимающим
оральные
контрацептивы
,
необходима
более
высокая
доза
, чем
не
принимающим
их
женщинам
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Противозачаточные свечи: мифы и реальность](#)

Ситуация 6. Необходимо приостановить прием оральных контрацептивов за 4 недели до хирургической операции, проводимой под общим наркозом. Причина этого – риск послеоперационного тромбоза.

Напоминаем, что решение о начале, временной приостановке или прекращении приема оральных контрацептивов, должно приниматься при непосредственном участии гинеколога. Прием дополнительных лекарственных средств также должен быть согласован с врачом