

Женские сексуальные дисфункции более не являются необычным явлением. Это состояние может развиваться в любом возрасте, но многие женщины сообщают о сексуальных проблемах в периоды гормональных колебаний: например, после беременности или во время менопаузы.

Как пишет [The Times of India](#), это может привести как к психологическим, так и к физическим проблемам.

Некоторые симптомы включают боль во время полового контакта, низкий сексуальный

интерес
и
невозможность
испытывать
оргазм
,
поддерживать
возбуждение
во
время
сексуальной
активности
и
тому
подобное
.

Кроме того, данная проблема менее изучена по сравнению с эректильной дисфункцией у мужчин, и, следовательно, недостаточно информативно, на сегодняшний день не существует методов ее лечения. К тому же женщины часто стесняются об этом говорить. А так как уровень сексуального влечения женщины меняется от партнера

к
партнеру
,
диагностика
сексуальных
расстройств
является
непростой
задачей
.

Однако, как говорит профессор кафедры репродуктивной биологии в Университете м
едицины

в
Кливленде
(
штат
Огайо
)
Шерил
Кингсберг
, "
женщинам
не
следует
тревожиться
по
поводу
потери
сексуального
желания
больше
, чем в
случае
артрита
или
любого
другого
отклонения
,
часто
связанного
со
старением
".

"Женщины должны говорить об этой проблеме со своими партнерами и со специалист
ами", - заяв

ила

Кингсберг

.

По

ее

словам

, "это

может

быть

профессиональный

консультант

,

секс-терапевт

,

врач

,

медсестра

или

другое

доверенное

лицо

".

Целый ряд очень интересных новых подходов к лечению низкого сексуального желан
ия у ж

енщин

находится

в

стадии

разработки

.

По

словам

Кингсберг

, они

могут

быть

представлены

на

суд

общественности

уже в

ближайшее

время

.