Автор: Administrator
03.06.2008 11:48 - Обновлено 11.06.2008 08:21

1.

Сдача анализов крови на ИППП производится натощак. Если планируется визит в клинику в первой половине дня (до 15.00) рекомендовано не завтракать и не обедать, а в случае сдачи анализов во второй половине дня (после 15.00) - не обедать. Т.е. минимальный промежуток, после которого можно сдавать анализы составляет 6-8 часов.

Нарушение этой рекомендации чревато тем, что не сработает внутренний лабораторный контроль и исследование придется повторить. В ряде случаев, например при постановке комплекса серологических реакций на сифилис, прием жирной пищи может быть причиной ложноположительного результата.

2.

Для исследования урогенитального материала (мазков) у мужчин требуется задержка мочеиспускания в течение 2 часов для предотвращения смывания содержимого уретры. Иногда требуется более длительная задержка - в

течение ночи, когда имеются очень незначительные симптомы уретрита - легкий дискомфорт в уретре или скудные выделения.

Забор мазков у женщин проводится по возможности в период вне месячных. Не рекомендуется использование спринцевания, а также любых вагинальных средств: свечей, овулей, таблеток и т.д. за 7 дней, а coitus (сексуальный контакт) за 24 часа до проведения исследования.

3.

При наличии каких-либо высыпаний на половых органах (в т.ч. покраснения, зуда, налета, бородавок и т.д.) могут потребоваться исследования соскобов непосредственно с очага поражения. В этих случаях рекомендовано избегать применения мазей, примочек, ванночек и других местных процедур за 3 сут. Не следует также смывать налет или выделения с поверхности кожи.

4.

Автор: Administrator
03.06.2008 11:48 - Обновлено 11.06.2008 08:21

В ряде случаев требуется исследование соскобов из ротовой полости. В этом случае не следует перед забором анализов принимать пищу, жевательные резинки, леденцы и средства гигиены полости рта.

5.

Для проведения бактериологических исследований следует воздерживаться от приема антибактериальных препаратов (антибиотиков и антисептиков) как внутрь, так и в виде местных инстилляций. Минимальный срок проведения бактериологических исследований после приема антибиотиков - 1 мес.

6.

Для проведения спермограммы рекомендовано половое воздержание не менее 3 и не более 7 суток. Эякулят (сперма) сдается путем мастурбации. Для получения репрезентативных результатов за 2 недели перед исследованием не следует принимать алкоголь, острую пищу.

7.

Для исследования секрета предстательной железы и семенных пузырьков рекомендовано половое воздержание минимум 2-3 суток.

8.

Для сдачи анализов на ИППП в настоящее время нет необходимости проведения различного рода "провокаций" как медикаментозных, так и пищевых.