Автор: Administrator
04.06.2008 17:24 - Обновлено 11.06.2008 08:19



За последние годы стремительно растёт количество больных с инфекциями, передаваемых половым путем. Вместе с этим растёт количество возбудителей, устойчивых к воздействию многих современных лекарственных препаратов. Инфекции, передаваемые половым путемОсобенностью инфекции, передаваемые половым путем, является её высокая контагиозность, вплоть до развития пандемия среди населения. Инфекции, передаваемые половым путем во много раз повышают риск заболеть таким страшным заболеванием, как ВИЧ инфекция.

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) относятся к серьёзным заболеваниям, которые могут принести огромный ущерб здоровью больного. Чем чаще пациент меняет своих половых партнеров, тем выше риск заражения ИППП. В тоже время есть случаи, когда достаточно только одного сексуального контакта, чтобы заразиться какой-либо инфекцией! Первыми и верными признаками инфекции, передаваемые половым путем, могут быть выделения из половых путей с запахом, язвочки, покраснения, пузырьки, микротрещины на коже или слизистой оболочке половых органов, зуд и боль во время мочеиспускания или полового контакта. Пациент, который впервые обнаруживает у себя эти симптомы, должен немедленно обратиться к доктору, который назначит лечение и поможет избежать серьёзных последствий. В большинстве случаев пациент не знает, есть ли инфекция у его партнера, да он и сам может этого не знать. Инфекции, передаваемые половым путем не всегда можно определить по клиническим признакам. Здесь на помощь приходят лабораторное обследование.

Выявление инфекций, передаваемых половым путем.Инфекции, передаваемые половым путем. Только специальное лабораторные методы исследования могут выявить наличие той или иной инфекции, или различных их сочетаний. Даже если выявляются характерные клинические признаки болезни, то всё равно без специальных методов исследования нельзя отличить, скажем, гонококковый процесс от уреаплазменного. Нельзя принимать до сдачи анализов никаких лекарственных препаратов. Даже приём одной таблетки антибиотика может дать ложный результат об инфекции. Также может привести к уменьшению вероятности выявления возбудителя и, следовательно, затруднить постановку диагноза и назначение лечения против данного возбудителя.

Автор: Administrator
04.06.2008 17:24 - Обновлено 11.06.2008 08:19

Количество инфекций, передаваемых половым путем, сегодня насчитывает более трех десятков заболеваний различной этиологии. Причиной развития этих заболеваний могут служить бактерии (сифилис, гонорея), вирусы (герпес, СПИД, остроконечные кондиломы), простейшие (трихомониаз), грибы (кандидоз). Установлено, что при половых контактах могут передаваться даже паразитарные заболевания кожи - чесотка, вшивость.

Инфекции, передаваемые половым путем. Большинство заболеваний, передающихся половым путем, протекают почти бессимптомно, либо с небольшими клиническими проявлениями, на которые больные часто не обращают внимание. Но если не лечится у специалиста - отдаленные последствия очень серьезны. К ним относятся и воспалительные заболевания органов малого таза с различными осложнениями, для репродуктивного возраста одно из грозных – бесплодие, различные гормональные нарушениями и функциональные нарушения различных органов и систем. При инфекциях, передаваемых половым путем, не происходит самоизлечения организма. А если через некоторое время симптомы исчезают – этого является признаком перехода заболевания в скрытую форму. Поэтому чем раньше выявлена инфекция и начато лечение, тем больше шансов излечиться от инфекции и не получить осложнений. К ним относится бесплодие, как у мужчин, так и у женщин, вплоть до развития острых состояний, требующие хирургического вмешательства, возможность внутриутробного заражения плода, развития пороков у плода, несовместимых с жизнью, нарушения течения беременности и родов, рождения нежизнеспособного или больного ребенка.