

Консультация [www.маммолог.онлайн](http://www.маммолог.онлайн)

Консультация [www.венеролог.онлайн](http://www.венеролог.онлайн)

**Гонорея** – это инфекционное заболевание, которое передается половым путем. Возбудителем гонореи является гонококк.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Молочница](#) - « дама » капризная

Первые симптомы заболевания у мужчин появляются на 2-5 сутки после заражения, у женщин – на 5-10 сутки.

Гонорея начинается с небольшого жжения и зуда в области мочеиспускательного канала.

Сначала появляются слизистые выделения,

но уже через 2-3 дня

выделения  
становятся  
слизисто-гнойными

, а  
затем

—  
гнойными

.  
Мочеиспускание  
сопровождается  
резкой  
болью

;  
наблюдаются  
частые  
позывы  
к  
мочеиспусканию

.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Опасные связи : что нужно знать о « взрослых » болезнях](#)

Следует отметить, что в некоторых случаях гонорея протекает бессимптомно, особенно у женщин

.

### **В чем опасность гонореи**

При отсутствии лечения гонорея может стать причиной бесплодия (как у мужчин, так и у женщин),  
внематочной беременности

,  
выкидыша

,

рождения  
мертвого  
и  
недоношенного  
ребенка  
и  
привести  
к  
повышению  
риска  
развития  
ВИЧ-инфекции  
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Хламидиоз](#) : [коварство](#) [и](#) [любовь](#)

При распространении гонококков на другие органы могут поражаться суставы, кожа,

головной  
мозг  
,  
сердце  
и  
печень  
, а  
также  
возникнуть  
гонококковый  
конъюнктивит  
.

### [История](#) [вопроса](#)

Поскольку гонококк является бактерией, то для лечения гонореи на протяжении мно  
гих  
лет  
используются  
антибиотики

.  
Но  
пока  
врачи  
сражаются  
с  
бактериями  
с  
помощью  
антибиотиков  
,  
бактерии  
сражаются  
с  
врачами  
и  
создают  
механизмы  
защиты  
,  
которые  
позволяют  
им  
ускользнуть  
от  
действия  
препаратов  
,  
выработав  
устойчивость  
к  
антибиотикам  
.

Так, в 1940-х годах гонококк приобрел устойчивость к сульфаниламидам, в 1980-х – к пенициллину

,  
тетрациклину  
,  
хлорамфениколу  
,  
эритромицину  
и  
стрептомицину

, а в 2007 г. – к  
фторхинолонам  
, в т.ч. к  
ципрофлоксацину

.

## **Современная ситуация**

В настоящее время для лечения гонореи используются только цефалоспорины треть  
его по  
колениа  
:  
цефиксим  
и  
цефтриаксон

.

Однако  
гонококк  
постепенно  
приобретает  
устойчивость  
и к  
этим  
антибиотикам  
. С 2006  
по  
2011 год  
устойчивость  
к  
цефиксиму  
увеличилась  
в 17 раз, а к  
цефтриаксону  
– в 10 раз.

Случаи гонореи, устойчивой к цефалоспорином, зарегистрированы в США, Японии, Н  
орвегии  
и  
Великобритании

.

## **Что делать**

Не стоит отчаиваться, ВОЗ разработала план действий, который не допустит распространения гонореи

,  
устойчивой  
к  
антибиотикам

.  
Основными  
положениями  
этого  
плана  
являются  
:

- Профилактика, ранняя диагностика и правильное лечение гонореи.
- Выявление случаев гонореи, устойчивой к антибиотикам.
- Создание лабораторий для определения устойчивости гонококка к антибиотикам.
- Создание новых препаратов для лечения гонореи .

[Запись на консультацию по телефону : 8 \(8634\) 36 46 01 в Таганроге](#)

Клиника работает ежедневно.

## В мире эпидемия гонореи! Достигнет ли она России? - Портал - Портал

Автор: <http://www.zdorovieinfo.ru>

23.06.2012 12:59 - Обновлено 16.05.2018 11:59

---

Часы приема врачей – с 10.00 до 15.00.

Суббота - с 10.00 до 13.00

E-mail: [klinika@vvi-klinika.ru](mailto:klinika@vvi-klinika.ru)

Лицензия № ЛО-61-01-001709