Автор: http://www.zdorovieinfo.ru
23.06.2012 12:59 - Обновлено 16.05.2018 11:59

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

Гонорея – это инфекционное заболевание, которое передается половым путем. Возбудителем гонореи является гонококк.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Молочница - « дама » капризная

Первые симптомы заболевания у мужчин появляются на 2-5 сутки после заражения, у женщин – на 5-10 сутки.

Гонорея начинается с небольшого жжения и зуда в области мочеиспускательного канала. Сначала появляются слизистые выделения, но уже через 2-3 дня

выделения
становятся
слизисто-гнойными
, а
затем
–
гнойными
.
Мочеиспускание
сопровождается
резкой
болью
;
наблюдаются
частые
позывы
к
мочеиспусканию
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Опасные связи : что нужно знать о « взрослых » болезнях

Следует отметить, что в некоторых случаях гонорея протекает бессимптомно, особенно у женщин
.

В чем опасность гонореи

При отсутствии лечения гонорея может стать причиной бесплодия (как у мужчин, так и у
женщин
),
внематочной
беременности
,
выкидыша
,

рождения
мертвого
и
недоношенного
ребенка
и
привести
к
повышению
риска
развития
ВИЧ-инфекции
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Хламидиоз : коварство и любовь

При распространении гонококков на другие органы могут поражаться суставы, кожа,

головной
мозг
,
сердце
и
печень
, а
также
возникнуть
гонококковый
конъюнктивит
.

История вопроса

Поскольку гонококк является бактерией, то для лечения гонореи на протяжении мно
гих
лет
используются
антибиотики

.
Но
пока
врачи
сражаются
с
бактериями
с
помощью
антибиотиков
,
бактерии
сражаются
с
врачами
и
создают
механизмы
защиты
,
которые
позволяют
им
ускользнуть
от
действия
препаратов
,
выработав
устойчивость
к
антибиотикам
.

Так, в 1940-х годах гонококк приобрел устойчивость к сульфаниламидам, в 1980-х – к
пенициллину
,
тетрациклину
,
хлорамфениколу
,
эритромицину
и
стрептомицину

, а в 2007 г. – к фторхинолонам, в т.ч. к ципрофлоксацину.

Современная ситуация

В настоящее время для лечения гонореи используются только цефалоспорины третьего поколения: цефиксим и цефтриаксон. Однако гонококк постепенно приобретает устойчивость и к этим антибиотикам. С 2006 по 2011 год устойчивость к цефиксиму увеличилась в 17 раз, а к цефтриаксону – в 10 раз.

Случаи гонореи, устойчивой к цефалоспоринам, зарегистрированы в США, Японии, Норвегии и Великобритании.

Что делать

Не стоит отчаиваться, ВОЗ разработала план действий, который не допустит распространения гонореи, устойчивой к антибиотикам. Основными положениями этого плана являются:

- Профилактика, ранняя диагностика и правильное лечение гонореи.
- Выявление случаев гонореи, устойчивой к антибиотикам.
- Создание лабораторий для определения устойчивости гонококка к антибиотикам.
- Создание новых препаратов для лечения гонореи .

Запись на консультацию по телефону : 8 (8634) 36 46 01 в Таганроге

Клиника работает ежедневно.

Часы приема врачей – с 10.00 до 15.00.

Суббота - с 10.00 до 13.00

E-mail: klinika@vvi-klinika.ru

Лицензия № ЛО-61-01-001709