

Новое – не всегда признак хорошего. А особенно если речь идет о новообразованиях в организме

Женские яичники подвержены повышенному риску новообразований

Некоторые из них могут сами рассосаться со временем, а какие-то удаляются только хирургическим путем

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Клиника предлагает спектр услуг](#)

Виктор Миронов/»Здоровье инфо» ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Боли , характерные для разрыва кисты](#)

яичника

Что такое киста?

Кистой называются заполненные жидкостью образования, которые могут образовываться в яичниках. Чаще всего у женщин детородного возраста.

- Существует несколько различных типов кист.
- Наиболее распространенная — функциональная киста.
- Она образуется во время овуляции, в том случае, если возникают затруднения с выходом яйцеклетки.
- Существуют

и
другие
виды
кист
:

Поликистозные яичники. В яичниках образуются многочисленные небольшие фолликулы

Эндометриоз. Клетки внутреннего слоя матки разрастаются в яичники. Болезненное заболевание, при котором могут возникнуть проблемы с фертильностью

Дермоидная киста. Этот вид кисты содержит ткани, нехарактерные для яичников (волосы, сальные железы).

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Новая программа диагностики патологии молочной железы](#)

Как образуются опухоли?

Если опухоль не является раковой, то ее называют доброкачественной. Различают следующие виды

опухолей

:

Эпителиальная опухоль яичника. Это самый распространенный вид опухолей, они обычно возникают на поверхности яичников

.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Рак яичников. Часто задаваемые вопросы](#)

Герминогенная опухоль яичников. Эти опухоли развиваются в первичных зародышевых клетках. Как правило, они доброкачественные

, хотя встречаются и исключения

.

Стромальная опухоль. Такие опухоли развиваются в клетках, которые производят женские гормоны

.

Причины рака яичников доподлинно не известны, однако можно обозначить некоторые факторы риска

:

- возраст (после менопаузы возникает большой риск);
- курение;
- ожирение;
- отсутствие детей.

Препараты, способствующие зачатию:

- заместительная гормональная терапия;
- наследственность.

Симптомы кисты и опухолей

Киста, особенно на первых этапах болезни, проходит бессимптомно. Проблемы она вызывает

в
случае
разрыва
или
кровотечения

.
Симптомы
кисты
и
опухолей
могут
включать
в
себя
:

- боли и вздутие брюшной полости;
- затрудненное мочеиспускание или частые позывы к нему;
- тупая боль в нижней части спины;
- боль во время полового акта;
- болезненные менструации и аномальные кровотечения;
- увеличение веса;
- тошнота или рвота;

- потеря аппетита.

Диагностика

Большинство подобных новообразований может быть выявлено во время гинекологического осмотра

тра

Большинство

из

них

доброкачественные

,

но

из-за

риска

рака

(

особенно

у

женщин

после

менопаузы

)все они

тщательно

проверяются

.

Анализы

могут

включать

в

себя

УЗИ,

резонансную

томографию

,

лапароскопию

и

оценку

уровня

гормонов

.

Как это лечится

Кисты нередко просто рассасываются, так что врач вполне может рекомендовать «внимательное ожидание».

Ожидание будет включать в себя регулярные проверки, не реже, чем раз в три месяца.

Боль могут облегчить противозачаточные таблетки. Они задерживают овуляцию и, таким образом, препятствуют развитию некоторых видов кисты.

В некоторых случаях применяется **хирургическое вмешательство**:

Лапароскопия. На животе делается маленький разрез, в который вводится инструмент для удаления

КИСТЫ
. Его,
обычно
используют
для
удаления
мелких
КИСТ

Лапаротомия предполагает большой разрез на животе. Таким образом удаляются крупные кисты и опухоли, в том числе раковые.

[Запись на консультацию по телефону: 8 \(8634\) 36 46 01 в Таганроге](#)

Клиника работает ежедневно.

Часы приема врачей – с 10.00 до 15.00.

Суббота - с 10.00 до 13.00

E-mail: klinika@vvi-klinika.ru

Лицензия № ЛО-61-01-001709

