




Британские ученые заявили, что смогли обнаружить следы столкновения нашей Вселенной с другими, параллельными, мирами. "Космические синяки" от взаимодействия вселенных сохранились благодаря так называемому реликтовому излучению, присутствующему в нашем мире почти с самого момента его возникновения при Большом Взрыве.

Согласно одной из принятых сегодня гипотез строения мира, **наша Вселенная входит в состав некоей огромной "Мультивселенной"**, представляя собой один из "пузырьков" в ней. Другие "пузырьки" отличаются от нашего мира особенностями физики пространства, но существуют одновременно во времени.

По мысли теоретиков, столкновения таких "пузырьков"-Вселенных между собой неизбежно должны оставлять следы. Ученым даже удалось рассчитать, что **эти следы будут представлять собой аномалии круглой формы**, вызванные гравитационным воздействием чужого мира на наш.

И вот группа британских ученых, изучающих реликтовое излучение, обнаружила в нем аномалии как раз предсказанной формы. Причем **таких "космических синяков" найдено сразу четыре штуки**.
Однако, отмечает

[Daily Mail](#)

, выводы Стивена Фини из лондонского Университетского колледжа и его коллег могут быть спорными.

По мнению скептически настроенных оппонентов, **в неоднородностях и флуктуациях реликтового излучения можно увидеть все, что угодно**

. Впрочем, они готовы поверить в выводы Фини, если будущее подтвердит новыми данными само существование "Мультивселенной".

Напомним, что в настоящее время большинство занимающихся этим вопросом теоретиков сходятся в том, что наша Вселенная возникла в результате Большого Взрыва около 13,7 миллиарда лет назад. Спустя 300 тысяч лет после него появилось реликтовое излучение, а спустя 300 миллионов начали формироваться звезды и галактики. Наше Солнце родилось всего пять миллиардов лет назад.