Автор: http://www.uroweb.ru
07.09.2011 13:53 - Обновлено 16.05.2018 13:56



И дневное, и ночное недержание мочи могут иметь генетическую основу, в соответствии с результатами нового, крупного исследования. Хотя было известно, что ночной энурез может быть наследственным, ранее только в немногих исследованиях отмечали связь между генетическими нарушениями и дневным контролем функции мочевого пузыря

.

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

Данные исследования, опубликованного в онлайн версии The Journal of Urology, свидетельствуют о том, что вероятность развития тяжелого дневного недержания у детей в 3-10 раз выше, если кто-то из родителей в анамнезе имеет данную патологию.

Д-р Александр фон Гонтард из Больницы при Университете Сирлэнда, Германия, и его коллеги изучали данные более 8000

детей в Великобритании в рамках исследования Avon Longitudinal Study of Parents and Children. Родители заполняли вопросники о своих эпизодах недержания мочи в дневное и ночное время в возрасте до 5 лет, а данные по детям собирали в возрасте до 7,5 лет. В целом, 15,5% и 7,8% детей страдают ночным и дневным недержанием мочи, соответственно. Тяжелая степень

ночного
недержания
мочи
,
определяемого
как 2 и
более
эпизода
в
неделю
,
встречается
у 2,6%
детей
. У 1%
детей
определили
дневное
недержание
мочи
тяжелой
степени
.

Исследователи отметили достоверные показатели при сравнении показателей недер
жания
мочи
у
детей
и
их
родителей
. При
наличии
у
мамы
или
отца
в
детском
возрасте
ночного
недержания
мочи

с
частотой
2
раза
в
неделю
и
более
риск
развития
недержания
мочи
тяжелой
степени
у
их
ребенка
возрастает
в 3,63 и 1,85 раз,
соответственно
(для
обоих
показателей
P