

Ученые выяснили, что одним из методов борьбы с пандемией СПИДа может стать профилактика вируса папилломы человека (ВПЧ), поскольку носители этой инфекции гораздо чаще других оказываются еще и ВИЧ-инфицированными.

В ходе изучения этих двух заболеваний, американским ученым удалось обнаружить взаимосвязь между ними.

В исследовании участвовали более 2.000 мужчин из Кении, в возрасте от 18 до 24 лет, ведущих активную сексуальную жизнь,

ВИЧ-отрицательных

и

которым

не

было

сделано

обрезание

. В

начале

наблюдения

их

проверили

на

наличие

вируса

папилломы

человека

.

Повторная

проверка

была

проведена

спустя

24

месяца

, а у

многих

– еще и

через

42

месяца

наблюдений

.

Как показали тесты, почти у половины (более 1000) мужчин была инфекция ВПЧ на к
оже
пениса

.

Спустя

42

месяца

,

почти

у 6%

из
них
обнаружился
и ВИЧ. Для
сравнения
,
из
тех, кто
не
имел
ВПЧ,
ВИЧ-положительными
оказались
только
около
4%.
По
словам
автора
исследования
доцента
эпидемиологии
в
Школе
глобального
общественного
здравоохранения
им
.
Гиллингса
при
Университете
Северной
Каролины
в
Чапел-Хилл
(
Gillings
School of Global Public Health at the University of North Carolina at Chapel Hill)
Дженнифер
Смит
,
даже
с
поправкой
на

обрезание

,
герпес
и
другие
факторы
риска
сексуального
и
социодемографического
характера

,
вероятность
заражения
ВИЧ

среди
тех
пациентов

, у
которых
во
время
первичной
проверки
был
обнаружен
ВПЧ,

можно
считать
значительно
повышенной
по
сравнению
с
остальными
мужчинами

.

Как сообщается в выпуске «Журнала инфекционных заболеваний» ([Journal of Infectious Diseases](#)

)
от
1
июня

, при
подтверждении
этих
данных
новыми
исследованиями

, в
рамках
борьбы
со
СПИДом
планируется
проводить
профилактику
ВПЧ, для
некоторых
видов
которого
уже
существуют
вакцины

.
Возможно

,
вакцинация
молодых
мужчин
до
начала
половой
жизни
приведет
к
замедлению
распространения
ВИЧ-инфекции

,
считают
специалисты

.