



Согласно последним результатам исследований, проводимых Стэнфордским университетом, в популярной сегодня гормональной терапии есть весьма существенные изъяны. У женщин, принимающих в период менопаузы эстроген и прогестерон, есть риск заболеть раком даже спустя два года после окончания гормонотерапии.

В исследовании участвовали 15 000 женщин, принимавших гормоны более 5-ти лет. У них была обнаружена вероятность развития рака даже после окончания курса гормонального лечения. Вероятность сердечных приступов и образования тромбов снижалась после того, как женщины прекращали гормональную терапию. В то же время риск онкологии оставался неизменным. Анализ также обнаружил, что после гормонотерапии возрастает риск рака не только молочной железы, но и легких.

Как сказала Марсия Стефаник, председатель координационного комитета Инициативы Женского Здоровья в Стэнфорде, «Мы хотели узнать, остается ли риск возникновения рака после окончания процедур. Увы, остается»

Исследователей волновал вопрос, насколько долго сохраняется опасность рака.

Они продолжили наблюдать за женщинами и в течение многих лет советовали пациенткам принимать гормоны для облегчения климактерических симптомов. Ученые также надеялись, что лекарства смогут защитить пациенток от заболеваний сердца.

Однако в 2002-м году комитет Инициативы Женского Здоровья обнаружил, что гормоны не только не предупреждают заболевания сердца, но и повышают риск сердечных

Автор: Administrator
25.06.2008 13:34 -

приступов, образования тромбов и рака молочной железы. Сенсационная новость заставила миллионы женщин прекратить прием гормонов.

Исследование, проводившееся Журналом Медицинской Ассоциации (jama.ama-assn.org), среди 15 730 женщин в возрасте от 50 до 79 лет, принимавших эстроген и прогестерон более 5-ти лет, доказало, что через два года после окончания гормонотерапии риск сердечных заболеваний снизился. У бросивших гормоны женщин он оказался на том же уровне, что и у женщин, принимавших плацебо. Также сократился риск колоректального рака и переломов костей.

Но каково же было удивление исследователей, когда они обнаружили, что риск возникновения онкологии был выше на 24 процента у женщин, принимавших гормоны, чем у тех, кто принимал плацебо. У 281-й женщины, проходившей гормонотерапию, был найден тот или иной тип рака. Онкология была найдена и у 218 женщин, принимавших плацебо. Риск рака молочной железы у женщин из первой группы был на 27 процентов выше. В группе гормонов было зафиксировано 79 случаев рака, а в группе плацебо – только 60. Источник <http://www.cleveland.com/>

Анастасия Крайнер специально для www.vvi-klinika.ru